

DELVIS FJERNELSE AF MANDLER

I FULD BEDØVELSE

(TONSILLOTOMI)

v. 1.5


(sidst opdateret maj 2017)

Dit barn har fået tid til delvis fjernelse af sine mandler (reduktion af mandlernes størrelse) i fuld bedøvelse.

Mandlernes funktion:

Mandlerne er en del af kroppens immunforsvar og udgør, sammen med det øvrige såkaldte lymfoide væv i svælget, en fremskudt post af immunforsvaret.

Da mandlerne kun udgør en del af det lymfoide væv i svælget, kan man sagtens reducere mandlernes størrelse, idet funktionen blot overtages af den del af mandlerne som lades tilbage og det øvrige lymfæv i svælget.



Hvorfor skal mandlerne opereres?

Den primære årsag til at reducere mandlernes størrelse er at de, af den ene eller anden grund, er blevet for store. Store mandler er ikke en sygdom, men kan medføre symptomer som søvnapnø (pauser i vejrtrækningen under søvnen) samt problemer med at synke og dermed spise almindelig kost. Størrelsen af mandlerne er i sig selv er ikke nogen grund til at operere – operationen foretages på baggrund af de gener som de store mandler medfører og de symptomer barnet har – **med andre ord – er der ingen gener fra mandlerne, så skal de ikke opereres.**

Såfremt der er tale om gener i form af tilbagevendende halsbetændelser, tidligere byld i halsen, dårlig ånde eller proppe i mandlerne, vil man typisk blive tilbudt en komplet fjernelse af mandlerne.

Det er vigtigt ikke at forveksle disse to operationer, idet der er markante forskelle på operationerne. Overordnet set er den komplette fjernelse et mere smertefuldt indgreb med en længere efterfølgende sygeperiode og flere mulige komplikationer, mens den simple reduktion at mandlernes størrelse er mindre smertefuld og uden samme risiko for efterfølgende komplikationer.

Før operationen – fasteregler:

Barnet skal faste (må ikke spise) i seks timer op til det aftalte operationstidspunkt. Det er tilladt at drikke klare væsker (sød saft, vand, og klar juice indtil to timer før operationen. Barnet må ikke drikke mælk eller juice som indeholder frugtkød. De sidste to timer inden operationen skal barnet være helt fastende. **To timer før operationen gives smertestillende. I udleveres en skriftlig instruks med dosis og præparat.**

OBS: Det er livsvigtigt at barnet er fastende, hvorfor alle operationer aflyses ved mindste tvivl herom !

Af hensyn til hygiejne og infektionsrisiko skal barnet møde nyvasket og med rent hår. Udendørssko og overtøj må ikke medtages på operationsstuen.

Barnet skal ledsages af to voksne personer, således at den ene kan tage sig af barnet under hjemtransporten. Andre børn må ikke medtages på operationsdagen.

Om bedøvelsen:

I klinikken møder I, på operationsdagen, klinikens faste speciallæge i anæstesiologi

som forestår selve bedøvelsen. Mens barnet er bedøvet sikrer narkoselægen sig at barnet sover trygt og godt og er smertedækket under hele indgrebet. Det er vigtigt at I har udfyldt anæsthesiskemaet inden i møder til operationen og afleverer dette i udfyldt stand (navn, CPR-nummer, højde og vægt) til anæstesilægen.

På operationsdagen skal I altid medbringe eventuel asthmamedicin (den orange/brune og blå inhalator) såfremt barnet er i behandling med dette.

Om operationen:

Selve indgrebet på mandlerne foregår gennem munden mens barnet sover. Efter operationen bliver barnet vækket igen og flyttet til et opvågningsleje, hvor vi sammen holder øje med barnet i ca. 30 minutter efter operationen. Såfremt der ikke er blødning kan I komme hjem igen.

Efter operationen:

I bør ikke tage offentlig transport hjem, men enten køre i bil, eller tage en taxa hjem sammen. I de første to døgn efter operationen skal der være en voksen sammen med barnet konstant

Efter operationen er der en meget lille risiko for, at der kan opstå pludselige blødninger fra området. Blødninger efter reduktion af mandler er sjældent kraftige, men skulle en kraftig blødning opstå, skal dette tages meget alvorligt. Det er derfor vigtigt at barnet i de første to døgn observeres tæt af forældrene, som kan reagere hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt.

I tilfælde af frisk blødning fra munden, eller hvis det ligefrem løber ud ad munden, eller næsen, skal du med det samme ringe 112 og blive kørt med ambulance til nærmeste hospital.

Er der på operationsdagen uopsættelige spørgsmål til operationen, kan klinikken kontaktes på telefon 44 98 19 21 (vælg akut henvendelse).

Efter operationen udleveres speciallæge Jacob Fiskers private visitkort med telefonnummer til brug ved uopsættelige henvendelser - alternativt sendes mail til INFO@JACOBFISKER.DK hvorefter I vil blive ringet op.

Risiko ved operationen:

Operationen medfører en meget lille risiko for blødning i dagene efter operationen. Dette skyldes, at man ved delvis fjernelse af mandlerne, (i modsætning til ved den totale fjernelse af mandlerne) ikke kommer ind til svælgets muskler og kar, men kun fjerner den yderste del af mandlerne hvori der kun er få blodkar og nervetråde.

Forholdsregler efter operationen:

Dit barn skal passes hjemme af en voksen resten af ugen, dvs. både på operationsdagen (onsdag) samt torsdag og fredag og weekenden og kan tidligst komme i institution igen om mandagen.

Hos nogle børn ses der forlængede forløb med smerter, hvorfor det anbefales at holdes klar i baghånden (f.eks. bedsteforældre) i dagene i den efterfølgende uge, såfremt barnet stadig ikke er friskt om mandagen efter operationen.

I forbindelse med opskrivning til operation er der lagt recept på apotekernes receptserver på smertestillende medicin (Bonyl mikstur) som kan gives sammen med Panodil i dagene efter operationen.

Kontrol efter operationen:

I forbindelse med opskrivelse til operation har I fået en kontroltid efter 8-12 uger, hvor vi sammen vurderer operationens resultat.

Husk altid, at hvis det ikke går som forventet ser vi hellere barnet en gang for meget end en gang for lidt !!!

Med venlig hilsen

Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd